Fluxo de manejo clínico de gestantes na Atenção Especializada

Paciente com sintomas de Sindrome Gripal (febre > = 38°C aferida ou referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta).

Paciente tem sinais de gravidade?

- Dispneia;
- Desconforto respiratório;
- Saturação de O2 < que 95%
- Piora nas condições clínicas de doença preexistente;
- Diminuição da movimentação fetal.

Não → Indicar isolamento domiciliar conforme protocolos da Atenção Primária à Saúde e contactar o posto de saúde para monitoramento

Sim → Síndrome Respiratória Aguda Grave- SRAG

Utilizar Oseltamivir em SRAG sem diasgnóstico até resultado de RT- PCR para SARS-CoV-2.
Se positivo, suspender o uso

Paciente tem indicação para internação em UTI?

- Choque;
- Disfunção de órgãos vitais;
- Insuficiência respiratória; ou
- Instabilidade hemodinâmica

Não

- Oxigenoterapia sob monitoramento;
- Hidratação venosa *;
- Exames complementares;
- Monitoramento fetal e de contrações uterinas conforme protocolo vigente

→ Acompanhamento leito clínico em isolamento individual ou coorte.

→ Notificar e Coletar exames específicos

Sim

- Suporte intensivo
- Oxigenoterapia sob monitoramento;
- Hidratação venosa *;
- Exames complementares
- Monitoramento fetal e de contrações uterinas conforme protocolo vigente

→ Acompanhamento leito de terapia intensiva em isolamento individual ou coorte.

→ Notificar e Coletar exames específicos

* **Não é indicado o uso profilático de antibióticos e, também, na ausência de comprovada infecção associada glicocorticoides não devem ser prescritos, no entando podem ser considerados em situações específicas, quando houver indicação clara para sua utilização** (sem evidências de benefícios no tratamento da infecção por SARS-CoV-2).

Fluxo adaptado Protocolo de Tratamento de Influenza (BVS-MS 2017), baseado nas recomendações do consenso de especialistas em manejo clínico do COVID-19